

ОСТОРОЖНО!

Сибирская язва: памятка для животноводов




МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ для владельцев животных:

- Обязательное взаимодействие с ветеринарными специалистами:
- предоставление животных для проведения клинического осмотра, вакцинации
 - информирование о вновь приобретенных животных
 - проведение карантина для вновь приобретенных животных с целью исследований и вакцинаций
 - проведение покупки, продажи, сдачи на убой, всех других перемещений животных, реализации животноводческой продукции только с разрешения государственной ветеринарной службы
 - экстренное сообщение о случаях заболевания, вынужденного убоя или гибели животных

ВНИМАНИЕ! Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не наступает или выражено слабо.

ВСКРЫТИЕ ТРУПОВ животных при подозрении на заболевание сибирской язвой **ЗАПРЕЩЕНО!**

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ
в Брянской области 8 (4832) 41-09-63, 41-09-67, в Калужской области – 8 (4842) 59-17-85, 79-92-43, в Смоленской области – 8 (4812) 64-22-92. 65-36-74



Сибирская язва - особо опасное заболевание человека и многих видов животных, характеризующееся поражением кожи, кишечника, легких, лимфатических узлов и высокой смертностью **Возбудитель** - спорообразующая бактерия, устойчивая к физико-химическим воздействиям, которая может сохраняться во внешней среде столетиями

Источник возбудителя больные животные, их жскременты (кал, моча, кровянистые истечения из естественных отверстий), а также зараженные сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды

Инкубационный период может быть от нескольких часов до 8 дней, чаще он составляет 2-3 дня

Основной путь заражения

у животных - через корма и воду, а также через укусы насекомых и органы дыхания, у человека при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, при хранении, транспортировке

ВНИМАНИЕ! Употребление крови и мяса животных в период неблагоприятной обстановки по СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ не допускается!

В зависимости от путей заражения у человека развивается **КОЖНАЯ, КИШЕЧНАЯ, ЛЕГОЧНАЯ** формы сибирской язвы:

КОЖНАЯ ФОРМА

Летальность
10- 20%


Покраснения, переходящие в черный с труп, а затем - в безболезненную язву
Высокая температура
Головная боль
Слабость

КИШЕЧНАЯ ФОРМА



Тошнота
Рвота с кровью
Кровавый понос
Боли в животе и пояснице

ЛЁГОЧНАЯ ФОРМА



Боли в груди
Кашель со слизистой мокротой, затем с кровью